

Ламинации	8.69 - 14.15
Масло сом	13.00 - 18.80
Майонез	21.73 - 28.40
Вода дистиллированная	Остальное

(11) 2034539 (13) C

[illegible]

(11) 2034540 (13) С
(51) 6 А 61 К 31/10
(21) 5055816/14 (22) 22.07.92
(72) Мирская А.Н., Лемковская Г.Г., Тен-
енберг Г.М.
(71) Иркутский институт органической
химии СО РАН

(54) (57) ГИПОХОЛЕСТЕРИНЕМИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО, отличающееся тем, что оно представляет собой трис(2-гидроксимил)элюмоний изодиал-3-тиоацетат форму-

Oc1ccc2c(c1)ccc(c2)CSCC(=O)[O-].[NH3+](OCCO)CCO

(14) 2034541 (13) С
(51) 6 А 61 К 31/30
(52) 5053269/14 (22) 29.06.97
(72) Варков С.А., Харлап Т.В., Некрасов
Р.В., Никитина Т.В., Курьятина В.Т., Фро
лова А.И.
(71) Товарищество с ограниченной ответ
ственностью "Фитолин"

73) Твердость: с ограниченной отслаиваемостью "Фибралит".

54) (57) СПОСОБ РЕКЛЕЗНАЯ И/ИЛИ ПРОФИЛАКТИКИ РЕКТИВОВ, включая такое выделение в первую очередь лекарственные средства, содержащих нелинейные производные хлорофилла и эфирных, отличающийся тем, что при лечении дачная реклеза на медные производные хлорофилла, по сравнению с водорослями левокаротина, реклеза пропорции 1:5 - 1:15 и 0,25% -ными растворами и вводится в виде: концентрированную инъекцию 2 раза в день по 20 - 40 мл полученного раствора, после чего больные хлорофиллом в водном масле повсюду.